

「維持透析患者の閉塞性動脈硬化症（ASO）－診断から治療まで－」正誤表

『維持透析患者の閉塞性動脈硬化症（ASO）－診断から治療まで－』に下記の誤りがありました。訂正いたします。

144ページ（表2）：

（誤）成分名「アルプロスタジル」の「規格」の欄に横の罫線が入っている

表2 閉塞性動脈硬化症に対する治療薬剤

1. 経口剤

成分名	商品名	規格	用法・用量
イコサペント酸エチル	エバデール [®] 300	300 mg	1800 mg 3分服
イコサペント酸エチル	エバデール [®] S300	300 mg	1800 mg 3分服
イコサペント酸エチル	エバデール [®] S600	600 mg	1800 mg 3分服
イコサペント酸エチル	エバデール [®] S900	900 mg	1800 mg 2分服
シロスタゾール	ブレタール [®]	50 mg	200 mg 2分服
		100 mg	
リマプロストアルファデクス	オバルモン [®]	5 μg	30 μg 3分服
	プロレナル [®]	5 μg	30 μg 3分服
ベラプロストナトリウム	ドルナー [®]	20 μg	120 μg 3分服
	プロサイリン [®]	20 μg	120 μg 3分服
塩酸サルボグレラート	アンブラーグ [®]	50 mg	300 mg 3分服
		100 mg	
塩酸チクロピジン	パナルジン [®] 錠	100 mg	300～600 mg 2～3分服
	パナルジン [®] 細粒	10% 1 g	

2. 静注剤

アルプロスタジル	バルクス [®]	5 μg (1 ml)	5～10 μg 1日1回
	リプル [®]	10 μg (2 ml)	
アルプロスタジル	プロスタンディン [®]	20 μg (5 ml)	動注 10～15 μg, 静注 40～60 μg 1日1～2回
アルファデクス	プロスタンディン [®] 500	500 μg (5 ml)	
アルガトロバン	スロンノン [®]	10 mg (20 ml)	1回 10 mg を輸液で希釈, 2～3時間 かけて点滴静注, 1日2回
	ノバスタン [®]		

（正）成分名「アルプロスタジル」の「規格」の欄に横の罫線が入らない

表 2 閉塞性動脈硬化症に対する治療薬剤

1. 経口剤

成分名	商品名	規格	用法・用量
イコサペント酸エチル	エバデール [®] 300	300 mg	1800 mg 3分服
イコサペント酸エチル	エバデール [®] S300	300 mg	1800 mg 3分服
イコサペント酸エチル	エバデール [®] S600	600 mg	1800 mg 3分服
イコサペント酸エチル	エバデール [®] S900	900 mg	1800 mg 2分服
シロスタゾール	ブレタール [®]	50 mg	200 mg 2分服
		100 mg	
リマプロストアルファデクス	オバルモン [®]	5 μ g	30 μ g 3分服
	プロレナル [®]	5 μ g	30 μ g 3分服
ベラプロストナトリウム	ドルナー [®]	20 μ g	120 μ g 3分服
	プロサイリン [®]	20 μ g	120 μ g 3分服
塩酸サルボグレラート	アンブラーグ [®]	50 mg	300 mg 3分服
		100 mg	
塩酸チクロピジン	パナルジン [®] 錠	100 mg	300 ~ 600 mg 2 ~ 3分服
	パナルジン [®] 細粒	10% 1 g	

2. 静注剤

アルプロスタジル	バルクス [®]	5 μ g (1 ml)	5 ~ 10 μ g 1日1回
	リプル [®]	10 μ g (2 ml)	
アルプロスタジル	プロスタンディン [®]	20 μ g (5 ml)	動注 10 ~ 15 μ g, 静注 40 ~ 60 μ g 1日1 ~ 2回
アルファデクス	プロスタンディン [®] 500	500 μ g (5 ml)	
アルガトロバン	スロンノン [®]	10 mg (20 ml)	1回 10 mg を輸液で希釈, 2 ~ 3時間 かけて点滴静注, 1日2回
	ノバスタン [®]		

注：商品「バルクス[®]」と「リプル[®]」は同じ製品で、どちらにも 5 μ g と 10 μ g の規格があります。